DLP-6-8-63 236072

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE =

ABONNEMENT ANNUEL

15 F.

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 40-00-74)
(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MAYENNE, MORBIHAN, ORNE)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 81, rue de Dinan - RENNES.
C. C. P.: RENNES 9.404-94

Supplément nº 1 au bulletin nº 35

5 AOUT 1963

INFORMATIONS /

POMMES DE TERRE

- MILDIOU -

Les conditions climatiques étant très favorables à cette maladie, il y a lieu d'exécuter un traitement sur toutes les variétés tardives pour préserver le feuillage de la destruction, assurer une bonne tubérisation et un rendement ultérieur convenable.

- DEFANAGE -

Dans toutes les cultures dont le feuillage est déjà fortement endommagé, procéder à la destruction totale du feuillage restant, pour éviter que les germes du Mildiou, entraînés au sol par les pluies, ne contaminent les tubercules provoquant des pertes de récolte et de mauvaises conditions de conservation.

La destruction des fanes sera faite par fauchage et enlèvement, hors de la culture ou par pulvérisation d'un produit chimique :

- soit spécialité commerciale défanante
- soit chlorate de soude à dose de 2 kgs pour 100 litres d'eau.

La quantité de bouillie pulvérisée étant dans l'un et l'autre cas de 800 à 1.000 litres à l'hectare.

La récolte sera faite ultérieurement par temps sec, et au plus tôt quinze jours après le défanage.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles

F.BARBOTIN & J.C. HENAFF.

l'Inspecteur de la Protection des Végétaux

J. DELOUSTAL

()

717

Imprimerie de la Station de Rennes · Directeur-Cénéral : L. BOUYX